




oddělení nukleární medicíny



Scintigrafie štítné žlázy



Scintigrafie štítné žlázy je nebolestivé vyšetření, kterým zjistíme velikost a uložení štítné žlázy.

Po injekci radioaktivní látky do žíly, se tato látka dočasně hromadí ve vyšetřovaném místě.

Na pracovišti nukleární medicíny získává lékař potřebné údaje o stavu pacienta pomocí přístrojů, které uvidíte v našich vyšetřovnách. Indikační látky se následně z těla vylučují močí a stolicí.

Scintigrafie štítné žlázy je vyšetření které není nebezpečné, protože radioaktivní záření, které tato látka uvolňuje, je srovnatelné s jedním rentgenovým vyšetřením plic, nebo páteře. Nezpůsobuje bolesti, není toxické. Injekce není bolestivá, budete cítit jen malé pichnutí jako při odběru krve.

Scintigrafie se provádí lidem každého věku. Jestli máte pochybnosti, týkající se Vašeho zdravotního stavu, oznamte je lékaři před injekcí. Pokud máte pochybnosti o tom zda nejste těhotná, oznamte to také. V případě, že kojíte, je nutné kojení na několik dní přerušit. Poradí Vám náš lékař.

Termín vyšetření na nukleární medicíně Vám domluví Váš ošetřující lékař. Je důležité, abyste se na vyšetření dostavili v dohodnutém termínu. Váš pozdní příchod může znamenat, že vyšetření nebude možno provést.

Před vyšetřením můžete jíst a pít. Pokud užíváte léky, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Po příchodu na oddělení se vždy ohlaste v naší evidenci!

Vyšetření: provádí se za 45 - 60 minut po injekci radioaktivní látky, kterou dostanete do žíly. Tato látka se dočasně hromadí ve štítné žláze. Její pomocí lze zjistit velikost, uložení štítné žlázy, cysty, nádory atd. Samotné vyšetření trvá přibližně od 20 - 40 minut.

Během vyšetření ležíte na zádech s mírně zakloněnou hlavou. Lze provést i vsedě. Zvolte pohodlné oblečení bez kovových doplňků (knoflíky, spony, flitry). Neberte si šperky. Vezměte si s sebou nátečník.

Vzhledem k tomu, že radioaktivní látka, kterou jste dostali do žíly se vylučuje močí, je nutné hodně pít a tím urychlit její vyloučení z těla.

Po vyšetření na oddělení nukleární medicíny je nutno v následujícím období dodržovat některá doplňková hygienická opatření:

V případě, že používáte jednorázové pleny, vložky, stomické a sběrné sáčky na moč, tento materiál je nutné ponechat doma v igelitovém sáčku a po 4 dnech zlikvidovat běžným způsobem.

V den vyšetření na našem oddělení doporučujeme vypít během dne alespoň dva litry tekutin.

V případě, že se z jakýchkoliv důvodů nemůžete na objednaný termín dostavit, prosím zavolejte přímo na naše oddělení den před vyšetřením

od 7.00 - 15.00 hod na tel.číslo:05/ 43 13 13 01