



Oddělení nukleární medicíny



Scintigrafie jater - Hemangiom

Scintigrafie jater je nebolestivé vyšetření, kterým sledujeme, jak rychle se naplní a vyprázdní játra krví. Po injekci radioaktivní látky do žíly se tato látka dočasně hromadí ve vyšetřovaném místě. Na pracovišti nukleární medicíny získává lékař potřebné údaje o stavu pacienta pomocí přístrojů, které uvidíte v našich vyšetřovnách. Indikační látky se následně z těla vylučují močí a stolicí.



Scintigrafie jater je vyšetření, které není nebezpečné, protože radioaktivní záření, které používaná látka uvolňuje, je srovnatelné s jedním rentgenovým vyšetřením plic nebo páteře. Nezpůsobuje bolesti, není toxické. Injekce není bolestivá, budete cítit jen malé píchnutí jako při odběru krve.

Čas mezi injekcí a provedením obrazu je různý, podle toho, který orgán vyšetřujeme. Někdy se provádí i následující den. Nemějte proto obavy, když se vyšetření prodlouží, protože se provádí více obrazů.

Scintigrafie se provádí lidem každého věku. Jestli máte pochybnosti, týkající se Vašeho zdravotního stavu, oznamte je lékaři před injekcí. Pokud máte pochybnosti o tom, zda nejste těhotná, oznamte to také. V případě, že kojíte, je nutné kojení na několik dní přerušit. Poradí Vám náš lékař.

Termín vyšetření na nukleární medicíně Vám domluví Váš ošetřující lékař. Je důležité, abyste se na vyšetření dostavili v dohodnutém termínu. Váš pozdní příchod může znamenat, že vyšetření nebude možno provést.

Ráno před vyšetřením na doporučení lékaře, který Vás na toto vyšetření posílá, užíjte 2 tablety Chlorigenu. Na toto vyšetření nemusíte přijít na lačno - je možná lehká snídaně. Můžete užívat léky a pít.

Po příchodu na oddělení se vždy ohlašte v naší evidenci!

Vyšetření je zahájeno tím, že dostanete do žíly 2 injekce v rozmezí 20 minut. Vyšetření provádíme za 1 hodinu od aplikace druhé injekce. Vyšetření se provádí vleže pod přístrojem v délce 30 minut. I když je vyšetření časově náročnější, je důležité v jeho průběhu zůstat v klidu.

Zvolte pohodlné oblečení bez kovových doplňků (knoflíky, spony, flitry). Neberte si šperky. Vezměte si s sebou nátělník.

Vzhledem k tomu, že radioaktivní látka, kterou jste dostali do žíly, se vylučuje močí, je nutné hodně pít a tím urychlit její vyloučení z těla.

Po vyšetření na Oddělení nukleární medicíny je nutno v následujícím období dodržovat některá doplňková hygienická opatření:

V případě, že používáte jednorázové pleny, vložky, stomické a sběrné sáčky na moč, tento materiál je nutné ponechat doma v igelitovém sáčku a po 4 dnech zlikvidovat běžným způsobem.

V den vyšetření na našem oddělení doporučujeme vypít během dne alespoň dva litry tekutin.

V případě, že se z jakýchkoliv důvodů nemůžete na objednaný termín dostavit, prosím zavolejte přímo na naše oddělení den před vyšetřením:

od 7:00 do 15:00, telefon: 543 131 301