

indikátor	DG	stádium				Celkem 2015 - 2022	Komentář
		I	II	III	IV		
3 leté přežití podle diagnóz a stádií onemocnění	ZN prostaty (C61)	91.2 (89.3; 93.0)	92.5 (90.0; 95.1)	89.3 (85.0; 93.9)	67.4 (62.6; 72.5)	86.0 (84.5; 87.5)	Uvedeno je celkové přežití od dne stanovení diagnózy ZN u všech pacientů diagnostikovaných nebo léčených v MOÚ bez ohledu na formu protinádorové léčby. Pro odhad přežití byla použita metoda dle Kaplana- Meiera na kompletním souboru pacientů diagnostikovaných v období 2015 až 2022. Všechny hodnoty jsou doplněny 95% intervalem spolehlivosti.
	ZN ledviny (C64)	85.5 (81.4; 89.9)	84.8 (74.9; 95.9)	73.5 (64.3; 83.9)	17.8 (12.6; 25.2)	64.2 (60.5; 68.1)	
	ZN močového měchýře (C67)	69.6 (61.3; 78.9)	51.9 (42.5; 63.4)	39.9 (29.2; 54.4)	13.6 (8.1; 22.9)	50.2 (45.9; 54.9)	
	ZN varlete (C62)	98.3 (96.4; 100.0)	98.1 (94.6; 100.0)	68.1 (55.7; 83.4)	stadium IV není definováno	92.5 (89.8; 95.4)	
5 leté přežití podle diagnóz a stádií onemocnění	ZN prostaty (C61)	80.6 (77.3; 84.0)	78.4 (73.0; 84.1)	74.8 (67.1; 83.3)	55.3 (49.5; 61.8)	73.6 (71.2; 76.0)	
	ZN ledviny (C64)	78.4 (72.9; 84.3)	74.7 (60.3; 92.6)	57.0 (45.4; 71.5)	9.7 (5.6; 17.1)	53.9 (49.7; 58.6)	
	ZN močového měchýře (C67)	60.8 (51.4; 71.9)	33.7 (24.3; 46.9)	23.2 (12.1; 44.5)	8.8 (4.3; 18.2)	39.5 (34.8; 44.8)	
	ZN varlete (C62)	98.3 (96.4; 100.0)	98.1 (94.6; 100.0)	64.7 (51.6; 81.1)	stadium IV není definováno	92.0 (89.1; 95.0)	

indikátor	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Celkem 2015 - 2022	Komentář
Podíl dosažených optimálních cytoredukcí (R0) z celkového počtu operovaných	87,7%	86,8%	93,8%	86,7%	77,7%	83,3%	81,2%	80,4%	83,2%	Uvedena je procentuální hodnota podílu resekovaných nádorů s výslednou R0 klasifikací dle hodnocení patologem. Hodnoty jsou vypočítány ze souboru nádorů s histopatologicky potvrzenou diagnózou zhoubného novotvaru urologické lokalizace.